arXiv:math/0303051v1 [math.AG] 5 Mar 2003

Géométrie algébrique/*Algebraic geometry*

À propos du groupe fondamental des variétés rationnellement connexes

Antoine Chambert-Loir

Centre de mathématiques (CMAT), École polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex
Courriel : `chambert@math.polytechnique.fr`

***Résumé.* —** Je démontre que le groupe fondamental d'une variété normale rationnellement connexe par chaînes est fini. La démonstration est valable en caractéristique différente de zéro.

Pour citer cet article : A. Chambert-Loir, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I ? ? ? (2003).

***Abstract* (On the fundamental group of rationally connected varieties)**

I show that the fundamental group of a normal variety which is rationally chain connected is finite. The proof holds in non-zero characteristic.

To cite this article: A. Chambert-Loir, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I ??? (2003).

Cette note a pour but de donner la démonstration du théorème suivant :

***Théorème*. —** *Soit k un corps algébriquement clos et soit X un k-schéma normal qui est rationnellement connexe par chaînes.*

a) *Le groupe fondamental de X est fini ;*

b) *Si $k = \mathbf{C}$, il en est de même de son groupe fondamental topologique.*

c) *Si la caractéristique de k est un nombre premier p, le groupe fondamental de X est d'ordre premier à p.*

Rappelons qu'une k-variété est dite rationnellement connexe par chaînes si pour tout corps algébriquement clos Ω contenant k, il passe par deux points généraux de $X(\Omega)$ une courbe connexe propre dont la normalisée est une réunion disjointe de droites projectives — autrement dit, deux points généraux sont joints par une chaîne de courbes rationnelles propres.

Si k est de caractéristique nulle et X lisse, on sait plus généralement que X est algébriquement simplement connexe, et même topologiquement simplement connexe si $k = \mathbf{C}$ (Campana [**2**], Kollár, Miyaoka, Mori [**14**]). La démonstration de Kollár, Miyaoka et Mori repose sur le fait que des chaînes de courbes rationnelles peuvent être contractées en une seule (lissification de courbes rationnelles), et cela nécessite que X soit propre, lisse et définie sur un corps de caractéristique zéro. Celle de Campana ne lissifie pas les courbes

rationnelles mais utilise la finitude du groupe fondamental topologique et la théorie de Hodge qui, sous ces hypothèses, entraîne que $H^i(X, \mathscr{O}_X) = 0$ pour $i > 0$.

Ce dernier point n'est pas nécessairement vérifié si la caractéristique du corps de base est différente de zéro, comme le montre l'exemple des surfaces construites par Shioda [**15**] qui sont à la fois de type général et unirationnelles ; elles ne sont d'ailleurs pas simplement connexes. En revanche, il résulte du théorème de de Jong et Starr [**11**] et d'arguments de Kollár (voir [**6**]) qu'une variété *séparablement rationnellement connexe* est simplement connexe. Je ne sais pas si la méthode que suit Kollár dans [**12**] pour démontrer le théorème en caractéristique zéro permet de traiter le cas général.

Rappelons aussi que d'après un théorème fondamental de Campana [**1**] et Kolllár, Miyaoka, Mori [**13**], les variétés de Fano (propres, lisses, connexe à fibré anticanonique ample) sont rationnellement connexes par chaînes. Leur démonstration est valable en caractéristique quelconque (*cf.* [**5**]). Le groupe fondamental d'une variété de Fano est donc toujours fini.

Démonstration

Lemme 1. — *Soit Ω une extension algébriquement close de k. Soit $F_\Omega \colon \mathbf{P}^1_\Omega \to X_\Omega$ une courbe rationnelle de X_Ω. Soit $x_0 = F_\Omega(0)$ et $x_\infty = F_\Omega(\infty)$; ce sont des points de X_Ω. Notons V_0 et V_∞ l'adhérence de leurs images dans X.*

Alors, il existe un k-schéma intègre T, un morphisme $F \colon \mathbf{P}^1_T \to X$ tel que les morphismes F_0 et F_∞ définis par $F_0(t) = F(0,t)$ et $F_\infty = F(\infty,t)$ soient dominants sur V_0 et V_∞.

Il existe une k-algèbre de type fini A, contenue dans Ω et un morphisme $F_A \colon \mathbf{P}^1_A \to X_A$ tel que $F_\Omega = F_A \otimes_A \Omega$. Soit F le corps des fractions de A. On a alors le diagramme de schémas

$$\operatorname{Spec} A \underset{\infty}{\overset{0}{\rightrightarrows}} \mathbf{P}^1_A \xrightarrow{F_A} X_A \xrightarrow{p} X, \qquad F_0, F_\infty \colon \operatorname{Spec} A \to X_A$$

Si F est le corps des fractions de A, cela signifie que les points x_0 et x_∞ appartiennent à $X(F)$, et qu'ils s'étendent en des morphismes f_0, $f_\infty \colon \operatorname{Spec} A \to X$. L'image par f_0 du le point générique de $\operatorname{Spec} A$ est le point générique de V_0. Par suite, l'image de f_0 contient un ouvert dense de V_0, et de même pour f_∞. (Comme f_0 est continue, $f_0^{-1}(V_0)$ est une partie fermée de $\operatorname{Spec} A$ qui contient son point générique (d'image x_0), donc est égale à $\operatorname{Spec} A$. Réciproquement, $f_0(\operatorname{Spec} A)$ est une partie constructible de X qui contient x_0, donc elle contient un ouvert dense de V_0.)

Pour démontrer le théorème, nous pouvons supposer que le corps k n'est pas dénombrable. Soit d un entier, $0 \leqslant d \leqslant \dim X$. L'ensemble des sous-schémas intègres de X qui sont de dimension d n'est pas dénombrable, si bien que toute famille dénombrable de sous-variétés de X évite au moins un point de X dont l'adhérence est de dimension d. Si Ω désigne la clôture algébrique du corps des fonctions de X, il existe alors dans $X(\Omega)$ des points généraux dont l'adhérence dans X est de toute dimension, en particulier de dimension 0 (un point de $X(k)$) ou de dimension $\dim X$ (un point « générique »).

La définition que X est rationnellement connexe par chaînes implique qu'il existe une chaîne de courbes rationnelles qui joint un point général $x_0 \in X(k)$ à un point générique $x_m \in X(\Omega)$. D'après le lemme 1, il existe une suite de sous-variétés intègres $V_0, \dots, V_m \subset X$, V_0 étant un point, et $V_m = X$, et pour tout entier $i \in \{0; \dots; m-1\}$ une famille de courbes rationnelles intègres

$$\mathbf{P}^1 \times T \xrightarrow{F} X$$

telle que les morphismes $F_0 \colon T \to X$ et $F_\infty \colon T \to X$, définis par $F_0(t) = F(0,t)$ et $F_\infty(t) = F(\infty, t)$ soient d'image denses dans V_i et V_{i+1} respectivement.

Quitte à remplacer T par un ouvert, on peut supposer qu'il est normal, ainsi que V_i et V_{i+1}.

Lemme 2. — *Soit $f \colon X \to Y$ un morphisme dominant entre schémas intègres normaux. Soit x un point géométrique de f, $y = f(x)$. L'image de $\pi_1(X,x)$ dans $\pi_1(Y,y)$ est d'indice fini.*

D'après ce lemme, l'image de $\pi_1(T)$ dans $\pi_1(V_i)$ et dans $\pi_1(V_{i+1})$ est d'indice fini. Le diagramme

$$\begin{array}{ccccc}
\pi_1(T) & \longrightarrow & \pi_1(V_i) & & \\
{\scriptstyle f_0}\downarrow{\scriptstyle \sim} & & & \searrow & \\
\pi_1(\mathbf{P}^1 \times T) & & \longrightarrow & & \pi_1(X) \\
{\scriptstyle f_\infty}\uparrow{\scriptstyle \sim} & & & \nearrow & \\
\pi_1(T) & \longrightarrow & \pi_1(V_{i+1}) & &
\end{array}$$

montre alors que les images de $\pi_1(V_i)$ et $\pi_1(V_{i+1})$ dans $\pi_1(X)$ sont commensurables, le sous-groupe image de $\pi_1(\mathbf{P}^1_T)$ étant d'indice fini dans chacun d'eux.

Comme $V_0 = \{x_0\}$ et $V_m = X$, le groupe fondamental de X est fini, ce qui termine la démonstration des assertions *a*) et *b*) du théorème.

On démontre alors l'assertion *c)* par des techniques de cohomologie p-adique qui combinent le théorème d'Esnault [**9**] et des arguments d'Ekedahl [**8**]. Je renvoie à [**4**] pour les détails.

Démonstration du lemme 2. — P. Deligne démontre ce lemme à la fin de *Théorie de Hodge II*, dans le cas de schémas lisses sur **C** ([**7**], lemme 4.4.17). Sa démonstration reste valable quasiment mot pour mot dans le cas qui nous intéresse.

Soit en effet t un point fermé de la fibre générique de f, T son adhérence de Zariski de f. C'est un sous-schéma fermé de X et f induit un morphisme génériquement fini $f\colon T\to Y$. Il existe un ouvert dense $U\subset Y$ tel que $V=f^{-1}(U)\cap T$ soit un revêtement étale de U. Considérons alors le diagramme de groupes fondamentaux

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(V) & \longrightarrow & \pi_1(X) \\ \downarrow{\scriptstyle\alpha} & & \downarrow{\scriptstyle f_*} \\ \pi_1(U) & \xrightarrow{\beta} & \pi_1(Y). \end{array}$$

L'image de $\pi_1(V)$ par l'application α est d'indice fini dans $\pi_1(U)$ car $V\to U$ est un revêtement étale.

D'autre part, U est un ouvert dense dans Y qui est un schéma normal ; par suite, l'homomorphisme $\pi_1(U)\to\pi_1(Y)$ est surjectif. Cela signifie en effet que la restriction à U d'un revêtement étale connexe, *resp.* d'un revêtement topologique connexe de Y est connexe. Considérons un tel revêtement $\pi\colon\tilde Y\to Y$. Si $Z=X\setminus U$, on a $\pi^{-1}(U)=\tilde Y\setminus\pi^{-1}(Z)$ et $\pi^{-1}(Z)$ est un fermé algébrique strict (*resp.* un espace analytique « nulle part dense » dans le cas topologique) de $\tilde Z$. De plus, $\tilde Y$ est un schéma normal (*resp.* un espace analytique normal dans le cas topologique). donc est irréductible. Dans le cas algébrique, $\pi^{-1}(U)$ est alors irréductible, donc connexe. Dans le cas topologique, il résulte du théorème p. 145 de [**10**] que $\pi^{-1}(U)$ est connexe.

L'image de $\pi_1(V)$ dans $\pi_1(Y)$ est ainsi d'indice fini, et il en est *a fortiori* de même de l'image de $\pi_1(X)$.

Remarque. — La même méthode permet de retrouver partiellement un résultat de Campana. Soit $\mathscr{C}$ une classe de groupes qui est stable par sous-quotient et extension par un groupe fini. Supposons que deux points généraux d'une variété X, propre et normale, soient reliés par une chaîne de sous-variétés Z_j telles que pour tout j, $\operatorname{im}(\pi_1(Z_j)\to\pi_1(X))$ appartienne à $\mathscr{C}$. Alors, si $\mathscr{C}$ est de plus stable par extension, on a $\pi_1(X)\in\mathscr{C}$. Cela s'applique en particulier si $\mathscr{C}$ est la classe des groupes virtuellement (pro)-polycycliques ou (pro)-résolubles.

En caractéristique zéro, Campana démontre aussi dans [**3**] ce résultat pour les classes des groupes virtuellement (pro)-nilpotents ou (pro)-abéliens (qui ne sont pas stables par extension). Il serait intéressant de le démontrer en caractéristique positive.

Références

[1] F. CAMPANA – « Connexité rationnelle des variétés de Fano », *Ann. Sci. École Norm. Sup.* **25** (1992), no. 5, p. 539–545.

[2] ______, « Remarques sur le revêtement universel des variétés kählériennes compactes », *Bull. Soc. Math. France* **122** (1994), no. 2, p. 255–284.

[3] ______, « Connexité abélienne des variétés kählériennes compactes », *Bull. Soc. Math. France* **126** (1998), no. 4, p. 483–506.

[4] A. CHAMBERT-LOIR – « Points rationnels et groupes fondamentaux : applications de la cohomologie *p*-adique », Séminaire Bourbaki 2002/03, 55e année, exposé 914.

[5] O. DEBARRE – *Higher-dimensional algebraic geometry*, Universitext, Springer-Verlag, New York, 2001.

[6] ______, « Variétés rationnellement connexes », à paraître dans *Astérisque* (2003), Séminaire Bourbaki, Vol. 2001/02, exposé 905.

[7] P. DELIGNE – « Théorie de Hodge II », *Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci.* **40** (1972), p. 5–57.

[8] T. EKEDAHL – « Sur le groupe fondamental d'une variété unirationnelle », *C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math.* **297** (1983), no. 12, p. 627–629.

[9] H. ESNAULT – « Varieties over a finite field with trivial Chow group of 0-cycles have a rational point », *Invent. Math.* **151** (2003), no. 1, p. 187–191, *arXiv:math.AG/0207022*.

[10] H. GRAUERT & R. REMMERT – *Coherent analytic sheaves*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, vol. 265, Springer-Verlag, Berlin, 1984.

[11] A. J. DE JONG & J. STARR – « Every rationally connected variety over the function field of a curve has a rational point », 2002, *http://www-math.mit.edu/~dejong/papers/familyofcurves3.dvi*.

[12] J. KOLLÁR – *Shafarevich maps and automorphic forms*, M. B. Porter Lectures, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1995.

[13] J. KOLLÁR, Y. MIYAOKA & S. MORI – « Rational connectedness and boundedness of Fano manifolds », *J. Differential Geom.* **36** (1992), no. 3, p. 765–779.

[14] ______, « Rationally connected varieties », *J. Algebraic Geometry* **1** (1992), no. 3, p. 429–448.

[15] T. SHIODA – « An example of unirational surface in characteristic *p* », *Math. Ann.* **211** (1974), p. 233–236.